Malvoisie de Lasseraz

Vass3R12s451-455



₩INNA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp677

Mahroid de nat of the 18 th 18

Photo GrappGenne 2008

Code Intro : **0Mtp677**Nom Var : Cépage non identifié
Nom Intro : Malvoisie de Lasseraz

 ${\bf Emplacement: Vass3R12s451\text{-}455}$

1











Désignation: Malvoisie de Lasserey

Clos Planche 9 Côté A Nº-124

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 24-9-56

4-0 2-0 3-8

3º Soque

PR.

Désignation: Malvoine de Laporor

Clos Planche 9 Côté A No 124

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 2-10-57
2-0
Pr-1

3-4

4 ª époque

M= le 4-9-1958 Pa-0

Maloaisie de Lassiraz

Désignation :

Clos Planche 9 caté A No 124

Vigueur: 3

Charge :

s. 12

27

37

13

50

Désignation: Malvoisie de Casseraz

Clos Planche 9 côté A No 124

Vigueur: 2631-859 P-0

. 13 multi

5 68

46?

5 117

Désignation : Malvoisi de laneray Olos Planche 9 côté A Nº 124 Vigueur & G Date de maturite 31-8 60 8. 16 3 8

I Planche 1558 Molvoisi de Lassera Désignation ; clos 9 Planche F Côté 124 No Vigueur : 2 Date de mâturité : 21.8.61 Charge : s. 1 14

s. 1 14

And 2 10

And And 3 19

And And 4 12

Désignation: Malvoisi de Lasteraz Clos Planche 9 Rang A Souche 124 Vigueur: 3 V 69862 Date de maturité : 30-9-62 Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE: TG - G - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

Obov - cyl - fus. s 1 21 Disc - sph - 611) - Ov.

s 3 24 avec pépins - apyrène

s 4 22 jus : inc - coloré.

8 5 22

Anné n°	Année 1956 Malvoisie de Lasseraz n°										
	Nombre total	.20.	123	1 2 6 D	A T :	E S	!	. ! .	•	1 .	
1 1	. 4	. 0.	0.	. 0.	2					!	
1 2	1 . 4	.0.	11.	.2.	*3.			· i ·			. !
1 3	.43	. 0.	12.	.2.	× 3.						. !
1 4	. 4.3	.0.	0 .	.1.	.1.						. !
1 8	!		1 !					1.			. !
1			1 1					!			1
		D	66-3	-56	D						

Année N° .	1957		Planche .		de s		az	ાન દારા	4
1 1 1	! Nombre ! total	11/3	13/3		DAT!	E S		!	! . !
! 1	6.	! 0.	3					1	
1 2	.6.	2.	3.			I !		1	
1 4	1 . 6.	1 2.	3.						
1 7	!					! ! • •		! ! • • !	! ! !
		T	e De	e 13-3	3-57				

Année : 1960

Nº . Mahairie de Lamergy Planche . 2 A 124

	!Nombre ! total	!	DATES						
	!	! 8.3	12-3 !						
1	114	! 0	17 . !						
2	12	! 2	6 . !						
3	112	! 0	16 1						
4	12	! 4	19 . 1						
5	no	11	16.1	! Ole! 11-3-60a!!!					

Année: 1961 chalvoisie de Lasseras Emplacement: 9 A 124 J 15 S8 ! !Nombre! ! !total! 27/2/3.3 6-3 DATES

!	!Nombre	27/2	3.3	6-3	DATES	!!!
! 1 ! 2 ! 3 ! 4	13 12 17 15 14	100	2 6 2 4	17 × 17 × 19 × 19 ×		
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10				!!!!!!!!!!!!!!!	Ded 6.3-161a	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Désignation: Malvoisie de Lasseraz

VASSAL Planche 9 Côté A Nº 124 Souche 1 2(3) 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

'41|31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 63 39 Clabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 5 cotonneuses 9.
- 44 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 2 MAI 1955 Truel Désignation: Malvoisie de Lasseraz.

VASSAL

Planche 9 côté # No 124 Souche 1 2345.

(A) BOURGEONNEMENT,

Colonne

- épancui - moyen 5 - globuleux 6.

22 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

\$230 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

- 43 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 10 |5 |57

Nº ordre Désignation: Malvoine de Lasseray VASSAL Planche 9 côté A Nº 124 souche 12045 (E) JEUNES FRUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7 - sur limbe 8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 · 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 de à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - axa-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

33 - entièrement 2 - partiellement 2 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 3.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies coloré s - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

26 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Designation: Molvoine de Lasseraz

VASSAL Planche 4 côté A Nº 124 souche † 2345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Loudin 13-6-55

Nº ordre Malvoisie de hasseras Désignation VASSAL planche 7 côté A Nº124 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne (2)- grande 3. - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan - en gouttière 2 - involute 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 🕖 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte O- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -

PETTOLE

- long 1 - moyen 2 - court

- glabre 4 - séteux 5 Pvelouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

vert plombé 4 - autre 5.

- aranéeux 4 duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre vev - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) / égal à 90° - (2) supérieur à 90° (3)

- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) handier 16-8-55 supérieur à 90° (3).

Nº ordre

Désignation

Malvoisie de la Geray

VASSAL planche 9 côté ANOLL couche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rougine 2-10-56

```
planche 9 côté 8 N°124 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
    - A pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident ) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

chalooisie de Easseraz

Nº d'ordre

Désignation

Money 12.9.56

Dénomination Mahourie...de Zenseresz..... côté ...A.... Rang 124... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2) court (3). Sarment 11 : grêle (1), fort (2). : ramifié (() peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6) saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel 27.11.56

```
N° d'ordre: . . . . . . . Désignation: chalvouse de Lasseraz
Origine: . . . . . .
Emplacement: . . . . . Vas. 9 A 124 . . Vign.
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . 1 - 8
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 -2-X-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 -2-3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1) - (2) - 3.
                  : 4-5
              Forme
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

Rouginer

```
No d'ordre : . . . . . . . Désignation : Malvoysie de Camerei
Emplacement: 7 4124. Vas. . . . . Vign. . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 0 - 3 - 3.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(3) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 8 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
          Direction : (1)-(2)-3.
          Forme : (4) - 5.
          Médiane/Base : 6 - 7 - 8.)
```

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3517

Année: 2008 grappgen 08

Observateur:

CodeIntro: 0Mtp677

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction: Malvoisie de Lasseraz

Emplacement: Vass3R12s451-455

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

très tardive 9. oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

	Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
	1	9	4/3 3dib	3 /5/3	4	
Tei	lle + Pongrue	13	1,/2	15/3	13	
"	3 0	12	4/3(3/46)	14/3 Oscania 6 0 11/3, 10 & 12/3	20	
"	4	M	4/3 3066	14/3 hdib le 11/3	9	
	5	10		7 dib 04/3	14	
	Moyenne	55		1213	47	9

Date de Date de floraison Taux de Date de véraison Début début début moitié maturité aoûtement moitié nouaison (oiv 306) (oiv 302) % (oiv 501) 22/5

Pien & 1915. Proche MF 18/1 Fécondé de 2/06, + 97 theres ovvette X +1 18,6A

Formulaire de description 2/8

(stade floraison)

Année: 2008

Code introduction:

Observateur: TD

Code cépage : 0Mtp677

Nom introduction : Malvoisie de Lasseraz

Emplacement: Vass3R12s451-

455

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 9.

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible T - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 37 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 – moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup : pulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

Formulaire de description 3/8

(stade floraison)

Année : 2008 Code cépage :

Code introduction: 0Mtp677

Nom introduction: Malvoisie de Lasseraz

Observateur: TD

Emplacement: Vass3R12s451-455

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte \(\mathbb{O}\)- verte \(\alpha\) raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 2- verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible B- moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence P- présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible P-moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence D- présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 1 subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moins 1 - 1,1 à deu 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 présence 9.

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 – rouge clair 2 – rouge foncé 3 – vert

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4 / 8
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année: 2008 Code cépage :

Code introduction: 0Mtp677

Nom introduction : Malvoisie de Lasseraz

Observateur: TD

Emplacement: Vass3R12s451-455

			LIMBE			3K12s451	
Code	Descripteur		1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille		Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe		1-Cordiforme	Z-Cunéiforme	3-Pentagon.	4-Orbicul.	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	2-Trois	35Cinq	4-Sept	5- + de sep	
Oiv 069	Couleur face supérieure l		Vert clair	Vert moyen	Vert foncé		
Oiv 070	Pigmentation anthocyani des nervures, face supério	5 Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ère bifurc.	4- Après 1 ^{ère} bifurc.		
Oiv 071	Pigmentation anthocyanide nervures, face inférieu	que (rouge)	[5Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1ère bifurc.	4- Après 1ère bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	re	1 Dlan				
Oiv 073			1-Plan	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmente
Oiv 072	Ondulation du limbe (entre Gaufrure du limbe	e nerv I ou II)	Absente				Présente
	(dépression entre nervures I et		Absente				Présente
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face su (relief entre nervures de dernie	r ordre)	Nulle à t. fb.	Paible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre ne	rv. face sup.in	Nulle à 1. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre ner	v. face inf.	Nulle at fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv		Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv.		Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.princi		Absente				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. princi	Absente				Présente	
Vassal	Densité p. couchés limbe fa	ce sup.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe fac	Nulleà t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
			PETIOLE				100 10110
Oiv 090	Densité poils couchés		Nulle àt. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nerv	ure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	Égal	Plus long	Beaucoup plus long
	SINUS PETIOLA	IRE (égalemen		feuilles d'herbie	er, formulaire	n° 7)	pius iong
Oiv 079	Ouverture	1-très ouvert		3- peu ouvert	4- fermé	5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants
080 viC	Forme de la base		1- en U	2) en accolade	3- en V	The state of the s	chevadenants
Oiv 81-1	Dent sur le bord		1- Absence	2- Présen	ice assez fréqu	iente de 1 ou 2	2 dents
Div 81-2	Base dégarnie		1- Absence	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés		
	SINUS LATERAUX SU	PERIEURS (ég	alement observa	ble sur feuilles d	herbier, form	nulaire n° 7)	
Oiv 082	Ouverture		1- absence de sinus	2 ouverts	3- fermés	4- lobes très chevauchants	
Div 83-1	Forme		1- en U	2- en accolade	32 en V		
Div 83-2	Dent		1- Absence	2- Présence 1	fréquente		
	DENTS (é	galement observ	able sur feuilles	d'herbier, form	ulaire n° 7)		
Div 076	Forme		1- côtés concaves	2- côtés rectilignes	3- notations 2 + 4	4- côtés convexes	5- un côté concave et
Div 077	Taille		Très petites	Petites	Moyennes	Grandes	l'autre convexe Très grandes
	Rapport longueur/largeur		Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues
		CARACTERI	E OBSERVABL			5	torigues
Div 501	Taux de nouaison (7 à 14 j.		Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)

Formulaire de description 5/8 (stade maturité) Observateur: St Desep / Table upris Revolte Année: 2008 Code introduction: 0Mtp677 Code cépage: Emplacement: Vass3R12s451-455 Nom introduction : Malvoisie de Lasseraz Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 Valeur absolue (en cm.): 16 cm longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm)(3)- moyenne (10-15 cm) 5 -Valeur absolue (en cm.): 9 large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208 forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidal 2 - en entonnoir 3. oiv 209 présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2 plus de trois ailes 3. Baie oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 longue Valeur absolue (en mm.): 19 (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 16 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3. oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jauné 1 rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2. (quelques baies legrement Raises oiv 227 **pruine**: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule: très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic: peu apparent 1 - apparent 2.) oiv 230 coloration de la pulpe : non colorée 1)- colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non coloré 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5. oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présent 3. oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - long 7 très longs 9. 7 & 8 mm oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1 - présentes 2. 000-11 axe de la rafle de la grappe : non coloré 2 coloré 1. Vassal:

000-18 région ombilicale : déprimée 1 – non déprimée 2.

Millerandage: nul à très faible 1 – faible 3 – moyen 5 – for (7) très fort 9.

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2008

GrapGene06

Observateur:

Code cépage: 0

Code introduction: 0Mtp677

Nom introduction : Malvoisie de Lasseraz Emplacement : Vass3R12s451-455

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 32 aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 22- rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 12 présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1- présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9,

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne (5) forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 800

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue :

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »